

Pasningsvejledning for Stære

1. Dyreart

Videnskabeligt navn: Sturnidae

Dansk navn: Stære

2. Fuldvoksen størrelse

Længde 17 – 45 cm afhængig af art, vægt 25 - 300 g afhængig af art.

3. Forventet levealder

Stære vil normalt opnå en alder af 8 – 12 år.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Et bur skal være så langt at fuglen kan flyve i buret. Til de mindre arter anbefales et bur, der er mindst 100 cm langt, 50 cm bredt og 50 cm højt. Til de store arter anbefales et bur, der er mindst 200 cm langt, 100 cm bredt og 100 cm højt. Buret indrettes med siddepinde af naturtræ og forskellig tykkelse i enderne af buret så fuglene kan flyve frit gennem buret. Buret må ikke anbringes på gulvet, men skal stilles på et bord eller i en reol uden træk og uden direkte sol.

Vand- og foderskåle anbringes så fuglene ikke kan klatte i skålene.

Bunden af buret dækkes med (avis)papir der let kan udskiftes efterhånden som det bliver snavset. Stære har ikke brug for sand i bunden af buret, hvis de æder af sandet kan de få problemer i fordøjelsessystemet.

Stære har forholdsvis tynd og rigelig afføring. Derfor anbefales en voliere på mindst 300 cm længde. Bredde 100 cm og højde 200 cm. Fra volieren skal der være adgang til et frostfrit inderum på 0,5—2,0 m².

Udendørs voliere skal være forsynet med en sluse, så fuglene ikke uforvarende kan flyve ud.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Stære bader jævnligt og skal hver dag have rent vand.

Stære bør ikke holdes udendørs i frostvejr.

6. Stimulering og behov for for motion

Som alle andre fugle har stære brug for motion. Det sikres bedst ved at holde dem parvis i rummelige bure eller volierer. Hvis stære holdes parvis vil de stimulere hinanden.

7. Fodring

Stære har brug for et bredt udvalg af fødeemner, hvoraf de vigtigste er frugt og insekter. Som grundfoder kan man anvende et færdigt Universalfoder der kan købes ved dyrehandlere. Sammen med universalfoderet gives ituskårne frugter (f.eks. æble, pære, banan, hyben, blomme, appelsin, melon), samt tilskud af levende eller frosne insekter eller insektlarver.

De store arter tager også gerne skrabet eller hakket magert kød. Kødet må kun serveres friskt og skal fjernes hvis fuglene ikke spiser det med det samme.

Stære kan tage en lille smule fuglefrø, men de dør hvis de kun får frø.

Stære skal have frisk drikkevand hver dag.

Endelig skal stære have en kalkblok eller en skål med knuste østersskaller kaldet grit.

8. Sociale behov

Stære lever i naturen parvis eller mindre grupper og har derfor et stort behov for at være sammen med artsfæller. Stære bør ikke holdes enkeltvis.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Stære er ynglevillige fugle. I naturen yngler stære i hulheder i træerne. I fangenskab giver man dem derfor redekasser. Bundfladen i rugerummet skal være ca 15 cm x 15 cm og højden ca. 25 cm, for store arter tilsvarende større redekasser.. Flyvehullet 5 – 10 cm i diameter. I buret/volieren af reden strøs redemateriale i form af strå, kokostrevler eller lignende.

Efter parringen lægger hunnen 3 - 5 æg i et kuld. Rugningen påbegyndes normalt når alle æg er lagt. Rugetiden er ca. 14 - 16 dage, hvorefter ungerne klækker samtidig; der ses dog af og til enkelte efternølere. I rugetiden makes hunnen af hannen, og hun forlader kun reden nogle minutter om dagen. Til opmadning af ungerne skal der gives levende eller optøet frosne insekter/insektlarver. Cirka tre uger efter klækningen forlader ungerne reden og bliver fodret af forældrene i yderligere 2 uger.

Stære kan være meget revirbeskyttende og angribe fugleholderen, hvis denne kommer ind i volieren under ruge- eller opmadningstiden.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Fugle er gode til at skjule sygdom. Derfor skal man være opmærksom på de mindste tegn på at fugles ikke trives, således at behandling kan sættes ind i tide.

Den raske fugl er livlig og bevæger sig hyppigt i løbet af dagen ved at flyve og klatre. Fjerdragten er stram, ren og glat. Næb og fødder rene og tørre og øjnene klare og agtpågivende.

Den syge fugl kan vise sine symptomer på mange forskellige måder. De mest almindelige tegn på sygdom er følgende:

- Nedsat ædelyst, fuglen sidder ved foderet uden at æde
- Fuglen puster sig op, ser træt ud og sætter hovedet under vingen, også om dagen
- Øjnene holdes halvt lukkede, tungt stødende åndedræt og ofte hvilende på begge ben
- Tynd ildelugtende afføring

Når sygdomstegnene tydeligt kan ses på fuglen haster det med at få den til dyrlæge, da den på dette tidspunkt allerede er meget syg.

Øvrige informationer

Udbredelse

Der findes talrige arter af stære i Europa, Afrika og Sydasi

Lovgivning og dokumentation

Stære er ikke omfattet af særlige fredningsbestemmelser i Danmark

Slutblok

Denne pasningsvejledning er for hold af fugle som familie- eller hobbydyr. Disse fugle kan eventuelt holdes forsvarligt på andre måder end beskrevet i denne vejledning.

Denne pasningsvejledning er lavet af Steen Samuelsen, Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (ldf-net.dk), 2014.